

УДК 519.7



## МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕХАНИЗМА СУБЪЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОЦЕНОК

М.Ф. Бондаренко<sup>1</sup>, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко<sup>2</sup>, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>ХНУРЭ, г. Харьков, Украина

Теория компараторной идентификации может быть применена не только для моделирования цветового зрения человека, но также и для целей математического описания других функций человеческого интеллекта (слух, осязание, узнавание, понимание), технических объектов. Здесь рассматривается компараторная идентификация субъективных оценок социально-экономических процессов.

КОМПАРАТОРНАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, МОДЕЛИ ОЦЕНОК, ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ, ПРЕДИКАТ ПОРЯДКА

### Введение

Наличие модели, достаточно точно предсказывающей оценку человеком места работы при ее поиске и выборе, важно для управления движением кадров и миграцией населения, для снижения текучести кадров на предприятиях, сокращения потерь среднего времени между увольнением и поступлением на работу, оптимизации распределения трудовых ресурсов по отраслям, планирования развития предприятия, жилищного строительства и тому подобного.

Место работы формально характеризуется вектором  $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ . Здесь  $x_1, x_2, \dots, x_m$  – вещественные числа, характеризующие различные стороны места работы, такие как размер зарплаты, удаленность от места жительства, срок предоставления жилплощади и ее размер, уровень обеспеченности дошкольными учреждениями и тому подобное. Оценка места работы характеризуется вещественным числом  $u$ , называемым степенью привлекательности места работы, которое линейно зависит от вектора  $x$ :

$$u = F(x) = x_1 k_1 + x_2 k_2 + \dots + x_m k_m. \quad (1)$$

Обозначим  $x_1 k_1 = u_1, x_2 k_2 = u_2, \dots, x_m k_m = u_m$ , тогда

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_m. \quad (2)$$

Числа  $u_1 + u_2 + \dots + u_m$  называются компонентами степени привлекательности места работы, они характеризуют степень привлекательности каждой стороны места работы.

Весовые коэффициенты  $k_1, k_2, \dots, k_m$  численно характеризуют удельную привлекательность каждой стороны места работы для данного человека. Набор чисел  $(k_1, k_2, \dots, k_m)$  полностью определяет реакцию конкретного лица, выбирающего место работы. Согласно описываемой здесь модели человек всегда предпочитает то место работы, которое обладает для него наивысшей степенью привлекательности. Целью структурной идентификации процесса оценки человеком места работы является решение вопроса о применимости описанной выше линейной модели к лицам, размышляющим

над выбором места работы. Задачей параметрической идентификации служит выведение из фактов поведения лица, выбирающего место работы, численных значений коэффициентов  $k_1, k_2, \dots, k_m$ .

Наличие социально-экономической интерпретации открывает дорогу для практического применения теории компараторной идентификации линейных конечномерных объектов к изучению процесса оценки человеком места работы. Вопрос о применимости линейной модели решается методами, изложенными в [1, 2]. Весовые коэффициенты  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , характеризующие поведение лица, выбирающего место работы, могут быть найдены методами, описанными в [3].

### 1. Компараторная идентификация процесса оценки человеком места работы

Применение компараторного метода предполагает наличие у человека способности устанавливать равенство и неравенство степени привлекательности любых двух мест работы. В действительности человек способен даже на большее: он может, кроме того, устанавливать, какое из предъявленных ему мест работы лучше, а какое – хуже. Два места работы будем считать равноценными, если человек затрудняется отдать предпочтение одному из них. Человек, устанавливающий равноценность и неравноценность двух мест работы  $x$  и  $y$ , реализует своим поведением предикат

$$E(x, y) = D(F(x), F(y)), \quad (3)$$

равный единице, когда места работы равноценны, и равный нулю – в противном случае, то есть в случае, когда одно из мест работы предпочтительнее другого. Приведенные выше соображения вводят, в дополнение к рассмотренным ранее, еще одну интерпретацию метода компараторной идентификации, которую мы назовем социально-экономической. Ранее же нами были введены три интерпретации, а именно – цветовая, техническая и пространственная. В отличие от других интерпретаций, при социально-экономической интерпретации выходной сигнал линейного объекта одномерен, следовательно,  $n = 1$ .

Специфика социально-экономических объектов требует большого объема статистических измерений для обеспечения достаточной точности моделирования. В этом случае была использована модель не в виде предиката равенства (3), требующего большого количества измерений, а в виде предиката порядка

$$P(F(x), F(y)),$$

где

$$P(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{если } u \geq v, \\ 0, & \text{если } u < v. \end{cases}$$

Поскольку выходные сигналы объекта  $u$ ,  $v$  можно идентифицировать как вещественные числа [4], то порядок на множестве входных сигналов существует и применение в качестве модели предиката порядка математически обосновано. Как показала практика, эта модель для социально-экономических объектов удобнее и значительно сокращает объем необходимых измерений.

## 2. Функциональный метод шкалирования входных сигналов объекта идентификации

Обратим внимание на одну проблему, выходящую за рамки задачи компараторной идентификации, без решения которой невозможно приступить к математическому описанию объекта. Речь идет о правильном выборе шкалы описания входных сигналов объекта. При компараторной идентификации цветового зрения человека эта проблема не возникала, поскольку Ньютон, описывая световое излучение энергетическим спектром, очень удачно выбрал шкалу. Именно при такой шкале цвет излучения оказывается линейной функцией излучения. Совсем иное создалось бы положение, если бы мы попытались использовать для описания светового излучения амплитудный спектр соответствующего электромагнитного колебания. Вторая шкала связана с первой нелинейно, поскольку мощность излучения при каждой длине волны пропорциональна квадрату амплитуды соответствующей гармоники электромагнитного колебания. Поэтому при описании светового излучения вторым способом его цвет уже не будет линейно зависеть от цвета, и метод компараторной идентификации линейного конечномерного объекта в данном случае окажется неприменимым.

Специфика задачи компараторной идентификации процесса оценки человеком места работы заключается в том, что компоненты  $x_1, x_2, \dots, x_m$  вектора места работы  $x$  по своей природе разнородны, каждый из них требует описания в своей собственной шкале. Нет никаких оснований надеяться, что с самого начала удастся выбрать шкалы правильно. Предположим, что все шкалы выбраны неправильно. Обозначим вектор места работы, получаемый при этих шкалах, символом

$x'$ , а его компоненты – символами  $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$ , так что  $x' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_m)$ . Зависимость степени привлекательности  $u$  места работы от параметров  $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$  запишется в виде:

$$u = F'(x) = g_1(x'_1)k_1, g_2(x'_2)k_2, \dots, g_m(x'_m)k_m. \quad (4)$$

Здесь  $g_i(x'_i) = x_i \overline{(i=1, m)}$  – некоторые функции, которые связывают сигналы  $x'_i$  и  $x_i$ , представленные соответственно в неправильной и правильной шкале.

Обозначим через  $G(x') = x$  зависимость, связывающую векторы  $x'$  и  $x$  одного и того же места работы, представленного соответственно в неправильных и правильных шкалах. Она задается равенством

$$G(x'_1, x'_2, \dots, x'_m) = (g_1(x'_1)k_1, g_2(x'_2)k_2, \dots, g_m(x'_m)k_m). \quad (5)$$

Человек, устанавливающий равноценность и неравноценность двух мест работы  $x'$  и  $y'$ , описанных в неправильных шкалах, реализует своим поведением предикат

$$E'(x', y') = E(G(x'), G(y')). \quad (6)$$

Предикат  $E(x, y)$  характеризует то же поведение человека, но для входных сигналов  $x = G(x')$  и  $y = G(y')$ , описанных в правильных шкалах.

Рассмотрим условие

$$E'((x'_1, a'_2, \dots, a'_{i-1}, a'_i, a'_{i+1}, \dots, a'_m), (a'_1, a'_2, \dots, a'_{i-1}, a'_i, a'_{i+1}, \dots, a'_m)) = 1. \quad (7)$$

Здесь  $a'_1, a'_2, \dots, a'_m$  – фиксированные компоненты вектора места работы, описанного в неправильных шкалах,  $x'_1$  и  $x'_1$  – переменные компоненты,  $i = \overline{1, m}$ . Для каждого значения переменной  $x'_i$ , чтобы соблюдалось условие равноценности мест работы  $(x'_1, a'_2, \dots, a'_{i-1}, a'_i, a'_{i+1}, \dots, a'_m)$  и  $(a'_1, a'_2, \dots, a'_{i-1}, a'_i, a'_{i+1}, \dots, a'_m)$  для данного человека, оценивающего место работы. В результате из опыта описываются зависимости  $x'_i = h_i(x'_1)$ , где  $i = \overline{1, m}$ .

Пользуясь зависимостями (1), (3), (5) и (6), перепишем условие (7) в виде:

$$g_1(x'_1)k_1 + g_2(a'_2)k_2 + \dots + g_{i-1}(a'_{i-1})k_{i-1} + g_i(a'_i)k_i + g_{i+1}(a'_{i+1})k_{i+1} + g_m(a'_m)k_m = g_1(a'_1)k_1 + g_2(a'_2)k_2 + \dots + g_{i-1}(a'_{i-1})k_{i-1} + g_i(x'_i)k_i + g_{i+1}(a'_{i+1})k_{i+1} + g_m(a'_m)k_m.$$

После упрощений имеем  $g_1(x'_1)k_1 + g_i(a'_i)k_i = g_1(a'_1)k_1 + g_i(x'_i)k_i$ . Решая последнее уравнение относительно  $x'_i$ , получаем  $x'_i = g_i^{-1}(g_1(x'_1)k_1/k_i + g_i(a'_i) - g_1(a'_1)k_1/k_i)$ . Таким образом,

$$h_i(x'_1) = g_i^{-1}(g_1(x'_1)k_1/k_i + g_i(a'_i) - g_1(a'_1)k_1/k_i). \quad (8)$$

Пусть  $x'' = (x''_1, x''_2, \dots, x''_m)$  – вектор места работы, компоненты которого представлены в промежуточных шкалах, для которых  $x''_1 = x'_1$ ,  $h_i(x''_1) = x''_i$ ,

где  $i = \overline{1, m}$ . Введем функцию  $H(x'') = x''$ , задаваемую равенством

$$H(x''_1, x''_2, \dots, x''_m) = (x''_1, h_2(x''_2), \dots, h_m(x''_m)). \quad (9)$$

Она связывает векторы  $x'$  и  $x''$  одного и того же места работы, представленного соответственно в неправильных и промежуточных шкалах. Человек, устанавливающий равноценность и неравноценность двух мест работы  $x''$  и  $y''$ , описанных в промежуточных шкалах, реализует своим поведением предикат

$$E''(x'', y'') = E'(H(x''), H(y'')). \quad (10)$$

Предположим, что два места работы  $(x''_1, x''_2, \dots, x''_m)$  и  $(h''_1, h''_2, \dots, h''_m)$ , описанные в промежуточных шкалах, равноценны. Это означает, что

$$E''((x''_1, x''_2, \dots, x''_m), (h''_1, h''_2, \dots, h''_m)) = 1. \quad (11)$$

Согласно (9) и (10), это условие равносильно следующему:

$$E''((x''_1, h_2(x''_2), \dots, h_m(x''_m)), (h''_1, h_2(h''_2), \dots, h_m(h''_m))) = 1.$$

В свою очередь, согласно (5) и (6), последнее равенство равносильно условию:

$$E''((g_1(x''_1), g_2(x''_2), \dots, g_m(x''_m)), (g_1(h''_1), g_2(h''_2), \dots, g_m(h''_m))) = 1.$$

Далее, согласно (1) и (3), только что записанное условие переписываем в виде

$$g_1(x''_1)k_1, g_2(h_2(x''_2))k_2 + \dots + g_m(h_m(x''_m))k_m = g_1(h''_1)k_1, g_2(h_2(h''_2))k_2, \dots, g_m(h_m(h''_m))k_m.$$

После замены по (8) и упрощений в последнем равенстве, окончательно получаем:

$$g_1(x''_1) + g_1(x''_2) + \dots + g_1(x''_m) = g_1(h''_1) + g_1(h''_2) + \dots + g_1(h''_m). \quad (12)$$

Полагая

$$F''(x'') = g_1(x''_1) + g_1(x''_2) + \dots + g_1(x''_m), \quad (13)$$

имеем

$$E''(x'', y'') = D(F''(x''), F''(y'')). \quad (14)$$

Значения функции  $F''(x'')$  можно принять в качестве степени привлекательности  $u$  места работы  $x''$ , представленного в промежуточных шкалах. Приравнявая слагаемые, зависящие от переменных  $x_i$  и  $x''_i$  ( $i = \overline{1, m}$ ) в выражениях (1) и (3), получаем  $x_i k_i = g_1(x''_i)$ , откуда

$$x_i = 1/k_i g_1(x''_i). \quad (15)$$

Выражение (15) показывает, что правильные шкалы для всех компонентов  $x''_1, x''_2, \dots, x''_m$  места работы определяются единственной функцией  $g_1$  с точностью до масштаба. Таким образом, для

отыскания правильных шкал описания входных сигналов объекта осталось определить из опыта вид функции  $g_1$ .

Предположим, что два места работы

$$(x''_1, a''_2, \dots, a''_{i-1}, x''_i, a''_{i+1}, \dots, a''_m) = (a''_1, a''_2, \dots, a''_{i-1}, x''_i, a''_{i+1}, \dots, a''_m),$$

описанные в промежуточных шкалах, равноценны. Для каждого значения переменной  $x''_1$  исследователь так подбирает значение переменной  $x''_i$ , чтобы только что сформулированное условие соблюдалось. В результате из опыта находится зависимость  $x''_i = l(x''_1)$ . Вид функции (1), вообще говоря, будет иным, если по-другому зафиксировать параметры  $a_1, a_2, \dots, a_m$ . С другой стороны, согласно (13) и (14), равноценность мест работы означает, что

$$g_1(x''_1) + g_1(a''_2) + \dots + g_1(a''_{i-1}) + g_1(x''_i) + g_1(a''_{i+1}) + \dots + g_1(a''_m) = g_1(a''_1) + g_1(a''_2) + \dots + g_1(a''_{i-1}) + g_1(x''_i) + g_1(a''_{i+1}) + \dots + g_1(a''_m).$$

После упрощений имеем

$$2g_1(x''_1) = g_1(a''_1) + g_1(x''_i).$$

Решаем последнее уравнение относительно  $x''_i$ :  $x''_i = g_1^{-1}(2g_1(x''_1) - g_1(a''_1))$ . Таким образом,

$$l_{a''_1}(x''_1) = g_1^{-1}(2g_1(x''_1) - g_1(a''_1)). \quad (16)$$

При функции  $l$  указан индекс  $a''_1$ , поскольку она зависит от параметра  $a''_1$ . Выражение (16) представляет собой функциональное уравнение, поскольку требуется по известной функции  $l_{a''_1}$  отыскать функцию  $g_1$ . Общий метод решения этого уравнения нам неизвестен. Однако в каждом конкретном случае его можно с определенной степенью приближения решить методом подбора функции  $g_1$ . Суть метода заключается в следующем. Принимаем в роли  $g_1$  какую-нибудь из стандартных монотонных функций: степенную, показательную, логарифмическую, степенной полином заданной степени и тому подобное. Подставляя выбранную функцию  $g_1$  в правую часть равенства (16), получаем выражение для функции  $l_{a''_1}$  при конкретном значении параметра  $a''_1$ . Далее определяем такие значения констант, определяющих конкретный вид функции  $g_1$  (например, значение показателя  $k$  для степенной функции  $x''_1^k$ ), при которых имеет место наилучшее приближение правой части равенства (16) к уже известному графику функции  $l_{a''_1}$ .

Например, применяя в роли функции  $g_1$  степенную функцию с произвольным показателем  $k$   $g_1(x''_1) = x''_1^k$ , получаем согласно (16) следующее выражение для функции  $l_{a''_1}$ :

$$l_{a''_1}(x''_1) = \sqrt[k]{2(\xi''_1)^k - (a''_1)^k}. \quad (17)$$

При  $a''_1 = 0$  имеем:

$$l_0(x''_1) = \sqrt[k]{2\xi''_1}. \quad (18)$$

Если экспериментально найденная функция  $l_0$  не может быть признана прямой, проходящей через начало координатной системы  $x''_1 x''_i$ , то нужно попробовать какую-нибудь другую шкалу, а если все возможности такого рода исчерпаны, применить степенной полином или какой-либо другой способ многопараметрического задания функции  $g''_1$ . Если же функция  $l_0$  подходит, то по углу наклона прямой  $x''_1 = \sqrt[k]{2\xi''}$  находим значение показателя степени  $k$ . Для окончательного заключения о приемлемости степенной шкалы следует еще удостовериться в том, что результаты вычислений по формуле (17) при ненулевых значениях параметра  $a''_1$  также согласуются с экспериментальными кривыми  $l_{a''}$ .

### 3. Табулирование изоморфизмов линейного предиката

Рассмотрим модель компараторной идентификации в виде  $m$ -мерного линейного предиката:

$$E(x, y) = D(Ax, Ay), \quad (19)$$

$x, y \in R^n$ ;  $A$  – матрица размерности  $m \times n$  и ранга  $m$ ,  $m \leq n$ . Для такой модели разработаны методы параметрической идентификации матрицы  $A$  [2].

Из практики известно, что существуют объекты, моделируемые следующим предикатом:

$$E_1(\xi, \eta) = D(F(\xi), F(\eta)), \quad (20)$$

где  $F$  – нелинейная вектор-функция;  $\xi, \eta \in R^n$ ;  $F(\xi), F(\eta) \in R^m$ . Эта нелинейность делает невозможным применение указанных выше параметрических методов идентификации. С другой стороны, недоступность выходных сигналов некоторых таких объектов для прямого измерения означает неприменимость к ним классических методов идентификации.

Найдем условие, достаточное для того, чтобы существовали шкалы измерения входных сигналов, делающие модель объекта линейной. Введем следующее ограничение на характеристическую функцию  $F$  предиката (19): для любых  $\xi, \eta$  существует такой изоморфизм  $\varphi$  предиката  $E_1(\xi, \eta)$  и линейного предиката  $E(x, y)$ ,

$$E_1(\xi, \eta) = E(\varphi(\xi), \varphi(\eta)) = E(x, y), \quad (21)$$

что

$$\varphi(\xi) = (\varphi_1(\xi), \varphi_2(\xi), \dots, \varphi_n(\xi)) = (x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (22)$$

Если выполняются эти условия, то, зная вектор-функцию  $\varphi$ , то есть способ изменения шкал входных сигналов, можно перейти от нелинейной модели объекта  $E_1$  к линейной  $E$ .

Целью настоящей работы является построение алгоритма нахождения вектор-функции  $\varphi$ . Поскольку  $\varphi$  находится из эксперимента, по точкам, то построим алгоритм табулирования  $\varphi$ . Начнем разработку алгоритма с определения размерности

$m$  вектор-функции  $F$ . Возьмем произвольный входной сигнал  $\xi$  и подберем входной сигнал  $\eta$  так, чтобы при любом параметре  $k$  выполнялось неравенство  $F(x) \neq F(k\eta)$ ,  $k\eta = (k\eta_1, k\eta_2, \dots, k\eta_n)$ . Затем подберем входной сигнал  $\gamma$  так, чтобы при любых параметрах  $k$  и  $l$  выполнялось неравенство  $F(l\xi + k\eta) \neq F(\gamma)$ . Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока будут находиться выходные сигналы с таким свойством. Полученный набор будет одним из возможных базисов подпространства входных сигналов, которое содержит область значений характеристической вектор-функции  $F$ . Размерность этого подпространства будет совпадать с размерностью  $F$ . Возможны три, с практической точки зрения, различных случая:  $m=1$ ,  $2 \leq m < n$ ,  $m=n$ . Последний случай тривиален, поскольку при  $m=n$  и выполнении условий (21) и (22) предикаты  $E_1 = E = D$ .

Рассмотрим случай  $m < n$ . Пусть предикаты  $E$  и  $E_1$  связаны равенствами (21) и (22), причем  $\varphi_i(\xi)$  – биекции,  $\varphi_i: R \rightarrow R$ . Пусть также из любого сочетания  $n-1$  индексов от 1 до  $n$  можно выбрать  $m$  таких, что

$$\forall \xi \in R^n \exists \{\delta_i \in R\}_{i \in I}, E_1(\xi, \sum_{i \in I} \Delta_i) = 1, \quad (23)$$

где  $I$  – множество из  $m$  выбранных индексов,  $\Delta_i \in R^n$ , причем  $i$ -я координата  $\Delta_i$  равна  $\delta_i$ , а остальные, соответственно,  $\delta_j^0$  – такой величине, что  $\varphi_j(\delta_j^0) = 0$ . (Последнее условие несколько усиливает условие  $m$ -мерности предиката  $E$ , требуя, чтобы почти все наборы из  $m$  единичных векторов были для него базисными).

Процедура табулирования всех  $n$  функций  $\varphi_i$  аналогична. Рассмотрим процедуру табулирования функции  $\varphi_1$ .

1. Определение нулей  $0_i$  функций  $\varphi_i$ , шагов табулирования  $h_i$  (в областях реальных значений функций  $\varphi_i$ ), верхних и нижних границ  $p_i^+$  и  $p_i^-$  значений функций  $\varphi_i$  ( $i = \overline{1, n}$ ).

Только в этом пункте требуется использование явных значений вектор-функции  $\varphi$  – величин  $0_i$ ,  $h_i$ ,  $p_i^+$ ,  $p_i^-$ . Значениями  $p_i^+$  и  $p_i^-$  примем соответственно максимальное и минимальное значения функций  $\varphi_i$ . В качестве нулей функций  $\varphi_i$  можно брать любые их значения, поскольку они определяют только положение системы координат, в которых находятся. С целью упрощения алгоритма табулирования примем  $0_i = p_i^-$ . Такой выбор  $0_i$  располагает все остальные значения  $\varphi_i$  в положительной области. Величины шагов табулирования  $h_i$  зависят от необходимой точности модели; число получаемых экспериментальных точек  $k$  можно вычислить по формуле  $k = ((p_i^+ - 0_i) / h_i) + 1$ .

Найдем такие величины  $\delta_i^0$ ,  $\delta_i^h$ ,  $\delta_i^+$ , что

$$\varphi(\delta_1^0, \delta_2^0, \dots, \delta_n^0) = (0_1, 0_2, \dots, 0_n),$$

$$\varphi(\delta_1^0, \dots, \delta_i^h, \dots, \delta_n^0) = (0, h_i, \dots, 0_n),$$

$$\varphi(\delta_1^0, \dots, \delta_i^+, \dots, \delta_n^0) = (0, \dots, p_i^+, \dots, 0_n), \quad i = \overline{1, n}.$$

Образуем вектор  $\Delta_1^1 = (\delta_1^0, \delta_2^0, \dots, \delta_n^0)$ .

2. Определение  $m$  индексов, не равных 1 (номеру табулируемой функции) из  $n-1$  оставшихся, таких что выполняется условие (8). Пусть, например, искомыми индексы — это номера от 2 до  $m+1$ .

3. Определение величин  $\delta_i \in R, i = \overline{2, m+1}$  таких, что

$$E(\Delta_1^1, \sum_{i=2}^{m+1} \Delta_i) = 1, \quad (24)$$

где  $\Delta_i \in R^n$  — векторы указанной в условии структуры.

#### 4. Определение величины $\delta_1^2$ :

4.1. Определение величины  $\delta_1^2$  такой, что

$$\varphi_1(\delta_1^2) = 2\varphi_1(\delta_1^1), \quad (25)$$

из условия

$$E_1(\overline{\Delta}_1^2, \Delta_1^2) = 1, \quad (26)$$

где

$$\overline{\Delta}_1^2 = (\delta_1^1, \delta_2, \dots, \delta_{m+1}, \delta_{m+2}^0, \dots, \delta_n^0). \quad (27)$$

Докажем, что равенства (26) и (27) выполняются одновременно. Согласно теореме об общем виде  $m$ -мерного линейного предиката  $E$  существует матрица  $A$  размера  $m \times m$  и ранга  $m$ , такая что

$$\forall x, y \in R^n E(x, y) = D(Ax, Ay), \quad (28)$$

где  $D$  — предикат равенства.

Перейдем в равенстве (25) от предиката  $E_1$  к предикату  $E$ , пользуясь условиями (22) и (28), а также представлением (23) функции  $\varphi$ :

$$\begin{aligned} 1 &= E_1(\Delta_1^1, \sum_{i=2}^{m+1} \Delta_i) = E(\varphi(\Delta_1^1), \varphi(\sum_{i=2}^{m+1} \Delta_i)) = \\ &= E((\varphi_1(\delta_1^1), O_2, \dots, O_n), (O_1, \varphi_2(\delta_2), \dots, \varphi_{m+1}(\delta_{m+1}), \\ &O_{m+2}, \dots, O_n)) = D(\varphi_1(\delta_1^1)A_1, \sum_{i=2}^{m+1} \varphi_i(\delta_i)A_i), \end{aligned}$$

где  $A_i$  —  $i$ -й столбец матрицы  $A$ . То есть мы показали, что

$$\sum_{i=2}^{m+1} \varphi_i(\delta_i)A_i = \varphi_1(\delta_1^1)A_1. \quad (29)$$

Сделаем аналогичный переход в равенстве (27):

$$\begin{aligned} E_1(\overline{\Delta}_1^2, \Delta_1^2) &= E(\varphi(\overline{\Delta}_1^2), \varphi(\Delta_1^2)) = E((\varphi_1(\delta_1^1), \varphi_2(\delta_2), \\ &\dots, \varphi_{m+1}(\delta_{m+1}), O_{m+2}, \dots, O_n), (\varphi_1(\delta_1^2), O_2, \dots, O_n)) = \\ &= D(\varphi_1(\delta_1^1)A_1 + \sum_{i=2}^{m+1} \varphi_i(\delta_i)A_i, \varphi_1(\delta_1^2)A_2) = \\ &= D(2\varphi_1(\delta_1^1)A_1, \varphi_1(\delta_1^2)A_1) = D(2\varphi_1(\delta_1^1), \varphi_1(\delta_1^2)). \end{aligned}$$

Мы воспользовались равенством (29) и тем, что вектор  $A_1 \neq 0$ . Случай  $A_1 = 0$  интереса не представ-

ляет, так как тогда значения  $\delta_1$  и  $\varphi_1(\delta_1)$  не влияли бы на предикаты  $E$  и  $E_1$ .

Так как  $\varphi_1$  — биективная функция, то существует величина  $\delta_1^2$  такая, что выполняется равенство (26), а значит, и равенство (27), что и требовалось доказать.

4.2. Определение величины  $\delta_1^2$  такой, что

$$\varphi_1(\delta_1^3) = 3\varphi_1(\delta_1^1), \quad (30)$$

из условия

$$E_1(\overline{\Delta}_1^3, \Delta_1^3) = 1, \quad (31)$$

где

$$D_1^3 = (\delta_1^3, \delta_2^0, \dots, \delta_n^0),$$

$$\overline{\Delta}_1^3 = (\delta_1^2, \delta_2, \dots, \delta_{m+1}, \delta_{m+2}^0, \dots, \delta_n^0).$$

Доказательство эквивалентности равенств (30) и (31) аналогично предыдущему.

Табулирование функции  $\varphi_1$  продолжается до тех пор, пока не будет пройден весь интересующий нас диапазон. На шаге 4.k определяется величина  $\delta_1^{k+1}$  такая, что

$$\varphi_1(\delta_1^{k+1}) = (k+1)\varphi_1(\delta_1^1), \quad (32)$$

из условия

$$E_1(\overline{\Delta}_1^{k+1}, \Delta_1^{k+1}) = 1, \quad (33)$$

где

$$\Delta_1^{k+1} = (\delta_1^{k+1}, \delta_2^0, \dots, \delta_n^0),$$

$$\overline{\Delta}_1^{k+1} = (\delta_1^k, \delta_2, \dots, \delta_{m+1}, \delta_{m+2}^0, \dots, \delta_n^0). \quad (34)$$

Общая таблица табулирования имеет вид ( $i = \overline{1, n}$ ):

Таблица 1

$\varphi_i(x_i)$	0	$h_i$	$2h_i$	...	$Nh_i$
$x_i$	$\delta_i^0$	$\delta_i^1$	$\delta_i^2$	...	$\delta_i^N$

Табулирование закончено.

Теперь рассмотрим частный случай, когда предикат  $E$  одномерен,  $m=1$ :

$$\forall x, y \in R^n E(x, y) = D(ax, ay), \quad (35)$$

где  $a \in R^n$ ;  $ax = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ . Хотя бы два компонента

вектора  $a$  (например,  $a_1$  и  $a_2$  не равны нулю). Предикат  $E_1$  связан с предикатом  $E$  равенством (21) и вектор-функция  $\varphi$  имеет вид (22) и, как и в случае  $m < n$ , является биекцией.

Тогда процедура табулирования вектор-функции  $\varphi$  следующая:

1. Все аналогично 1-му шагу общего случая  $m < n$ , за исключением того, что шаг табулирования  $h$  одинаков по всем компонентам  $\varphi_1, i = \overline{1, n}$ .

2. Определение величины  $\delta_2^1$ , равновеликой величине  $\delta_1^1$ , то есть такой, что

$$\varphi_2(\delta_2^1) = \varphi_1(\delta_1^1). \quad (36)$$

Для этого воспользуемся условием

$$E_1((\delta_1^1, \delta_2^0, \delta_3, \dots, \delta_n), (\delta_1^0, \delta_2^1, \delta_3, \dots, \delta_n)) = 1, \quad (37)$$

где  $\delta_3, \dots, \delta_n$  – произвольные фиксированные величины. Действительно, перейдем к предикату  $E$  по формуле (21):

$$E((\varphi_1(\delta_1^1), 0_2, \varphi_3(\delta_3), \dots, \varphi_n(\delta_n)), (0_1, \varphi_2(\delta_2^1), \varphi_3(\delta_3), \dots, \varphi_n(\delta_n))) = 1. \quad (38)$$

Прежде чем воспользоваться представлением (20) предиката  $E$ , выполним его упрощение. Без ограничения общности можно считать, что если  $a_i \neq 0$ , то  $a_i \neq 1$ ,  $i = \overline{1, n}$ . Действительно, если  $a_i \neq 0$ , то можно положить  $\varphi'_i(\xi_i) = 1/a_i \varphi_i(\xi_i)$ . Очевидно, что функции  $\varphi'_i$  образуют изоморфизм  $\varphi'$  предикатов  $E_1$  и  $E'$ , такой что  $\forall \xi, \eta \in R^n$   $E_1(\xi, \eta) = E'(\varphi'_1(\xi_1), \dots, \varphi'_n(\xi_n))$ , причем вектор-функция  $\varphi'$  и предикат  $E'$  обладают всеми свойствами вектор-функции  $\varphi$  и предиката  $E_1$  соответственно. Значит, будем считать, что  $a_i = 1$  или  $a_i = 0$ ,  $i = \overline{1, n}$ . Пользуясь последним условием, равенством (35) и тем, что  $a_1 \neq 0$  и  $a_2 \neq 0$ , перейдем от (38) к следующему равенству:

$$\begin{aligned} \varphi_1(\delta_1^1) + 0 + \varphi_3(\delta_3) + \dots + \varphi_n(\delta_n) = \\ = 0 + \varphi_2(\delta_2^1) + \varphi_3(\delta_3) + \dots + \varphi_n(\delta_n). \end{aligned}$$

Величины, зависящие от  $\delta_3, \dots, \delta_n$ , взаимно уничтожаются и остается не зависящее от них равенство

$$\varphi_1(\delta_1^1) = \varphi_2(\delta_2^1), \quad (39)$$

что и требовалось показать.

### 3. Табулирование функции $\varphi_1$ .

3.1. Определение величины  $\delta_1^2$  такой, что

$$\varphi_1(\delta_1^2) = 2\varphi_1(\delta_1^1). \quad (40)$$

Для этого достаточно воспользоваться условием

$$E_1((\delta_1^1, \delta_2^1, \delta_3, \dots, \delta_n), (\delta_1^2, \delta_2^0, \delta_3, \dots, \delta_n)) = 1. \quad (41)$$

Действительно, используя равенства (21), (35) и условие  $a_i = 1$  или  $a_i \neq 0$ ,  $i = \overline{1, n}$ , получим:

$$\varphi_1(\delta_1^1) + \varphi_2(\delta_2^1) = \varphi_1(\delta_1^2).$$

Вместе с равенством (36) это дает требуемое соотношение (40).

3.2. Определение величины  $\delta_1^3$  такой, что

$$\varphi_1(\delta_1^3) = 3\varphi_1(\delta_1^1). \quad (42)$$

Для этого следует воспользоваться условием

$$E_1((\delta_1^2, \delta_2^1, \delta_3, \dots, \delta_n), (\delta_1^3, \delta_2^0, \delta_3, \dots, \delta_n)) = 1. \quad (43)$$

Доказательство аналогично предыдущему.

Табулирование продолжается до тех пор, пока не будет пройден весь интересующий нас диапазон, то есть до шага 3.N, когда

$$\delta_1^N \geq \delta_1^{p^+}, \delta_1^{N-1} < \delta_1^{p^+}. \quad (44)$$

4. Табулирование функций  $\varphi_1$ ,  $i = \overline{2, n}$  таких, что  $a_i \neq 0$ . Для определения величины  $\delta_i^k$  такой, что

$$\varphi_i(\delta_i^k) = kh, \quad (45)$$

следует воспользоваться условием

$$E((\delta_1^k, \delta_2, \dots, \delta_{i-1}, \delta_i^0, \delta_{i+1}, \dots, \delta_n), (\delta_1^0, \delta_2, \dots, \delta_{i-1}, \delta_i^k, \delta_{i+1}, \dots, \delta_n)) = 1, \quad (46)$$

$i = \overline{2, n}$ ,  $k = \overline{1, N}$ .

Доказательство такое же, как и в п. 3.1. Если  $a_i = 0$ , то значения  $\delta_i$  и  $\varphi_i$  не влияют на предикаты  $E_1$  и  $E$ . Общая таблица табулирования имеет вид:

Таблица 2

$\varphi_i(\xi_i)$	0	$h$	$2h$	...	$Nh$
$\xi_i$	$\delta_i^0$	$\delta_i^1$	$\delta_i^2$	...	$\delta_i^N$

Табулирование закончено.

Теперь, имея результаты табулирования, можно проверить выполнение условий (21) и (22). Если предикат  $E$  обладает свойствами  $m$ -мерного линейного предиката, то эти условия выполняются. Условие (23) также можно проверить только после табулирования, используя известные предикаты  $E_1$  и  $E$ . На практике достаточно найти хотя бы один  $m$ -мерный базис предиката  $E$ .

### Выводы

Рассмотрены возможности применения компараторной идентификации при изучении социально-экономических процессов. Предложены компараторные модели процесса оценки человеком места работы в виде предиката эквивалентности и предиката порядка. Разработан функциональный метод шкалирования входных сигналов нелинейного объекта компараторной идентификации. Разработана процедура табулирования входных сигналов широкого класса нелинейных объектов компараторной идентификации, как одно-, так и многомерных. Сформулированы свойства нелинейного объекта компараторной идентификации, достаточные для его структурной идентификации методами, разработанными для линейных объектов.

**Список литературы:** 1. Бондаренко, М.Ф. Об общей теории компараторной идентификации [Текст] / М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2008. – № 2(68). – С. 13-22. 2. Бондаренко, М.Ф. Идентификация объектов, описываемых числовыми системами [Текст] / М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2008. – № 2(68). – С. 23-31. 3. Бондаренко, М.Ф. Разработка систем условий,

обеспечивающих существование линейного конечно-мерного оператора [Текст] / М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнарченко, Ю.П. Шабанов-Кушнарченко // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2009. – № 1 (70). – С. 11-17. 4. Бондаренко, М.Ф. Практические приложения компараторной идентификации линейных конечномерных объектов [Текст] / М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнарченко, Ю.П. Шабанов-Кушнарченко // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2009. – № 2 (71). – С. 5-12.

*Поступила в редколлегию 17.09.2009*

---

УДК 519.7

**Методи ідентифікації механізму суб'єктивних соціально-економічних оцінок** / М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнарченко, Ю.П. Шабанов-Кушнарченко // Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – 2009. – № 2 (71). – С. 24-30.

У статті розвивається теорія компараторної параметричної ідентифікації. Використовується модель у вигляді предиката порядку. Розглядаються методи ідентифікації суб'єктивних оцінок соціально-економічних процесів – функціональний метод шкалювання вхідних сигналів та метод табулювання ізоморфізмів лінійного предиката.

Бібліогр.: 4 найм.

UDC 519.7

**Methods of the subjective social and economic estimations mechanism identification** / M.F. Bondarenko, S.Yu. Shabanov-Kushnarenko, Yu.P. Shabanov-Kushnarenko // Bionika intellekta: Sci. Mag. – 2009. – № 2 (71). – P. 24-30.

In article the comparator parametrical identification theory is develops. The model in the form of an order predicate is used. Methods of identification of value judgment of social and economic processes – the entrance signals functional scaling method and the isomorphism of a linear predicate tabulation method are considered.

Ref.: 4 items.