

УДК 510.62

Н.А. ГВОЗДИНСКАЯ, З.В. ДУДАРЬ, С.А. ПОСЛАВСКИЙ,
Ю.П. ШАБАНОВ-КУШНАРЕНКО

О ЛОГИЧЕСКИХ МАТРИЦАХ

Данная статья является продолжением работы [1]. Обозначим символом K множество логических скаляров $K=\{0,1\}$ [2]. Произвольная система элементов совокупности K , расположенная в виде прямоугольной таблицы, содержащей m строк и n столбцов, называется логической (m, n) — матрицей над K или просто логической матрицей. Чтобы записать матрицу, выпишем обозначения ее элементов и получившуюся таблицу заключим в скобки или ограничим двойными чертами [3].

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\|.$$

Логическая матрица, число строк которой совпадает с числом столбцов, называется *квадратной*. Для квадратной логической матрицы число ее строк (или столбцов) называется *порядком квадратной логической матрицы*. Квадратная логическая матрица, все диагональные элементы которой равны единице, а остальные — нулю, называется *единичной логической матрицей* и обозначается символом E . Матрица, все элементы которой равны нулю, называется *нулевой логической матрицей* и обозначается символом 0 . Две логические матрицы называются *равными*, если число строк и столбцов у них соответственно равны и если логические скаляры, стоящие на соответственных местах этих матриц, тоже равны. Таким образом, одно равенство между (m, n) — матрицами равносильно системе mn равенств между их элементами. Логическая матрица, имеющая только одну строку, называется просто *логической строкой*, а число ее элементов — *длиной строки*. Логическая матрица, имеющая только один столбец, называется *логическим столбцом*, а число его элементов — *высотой столбца*.

В качестве основных операций над логическими матрицами принимаем: логическое умножение скаляра на матрицу или матрицы на скаляр, логическое сложение (дизъюнкцию) двух матриц, отрицание матриц, логическое умножение (конъюнкция) матриц. Чтобы умножить логический скаляр α на логическую матрицу A , нужно умножить на α все элементы матрицы A .

$$\alpha A = \alpha \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \dots & \alpha a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

$$A\alpha = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \alpha = \begin{pmatrix} a_{11}\alpha & a_{12}\alpha & \dots & a_{1n}\alpha \\ a_{21}\alpha & a_{22}\alpha & \dots & a_{2n}\alpha \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}\alpha & a_{m2}\alpha & \dots & a_{mn}\alpha \end{pmatrix}.$$

Например:

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 & 1 \wedge 0 & 1 \wedge 1 \\ 1 \wedge 0 & 1 \wedge 0 & 1 \wedge 1 \\ 1 \wedge 1 & 1 \wedge 1 & 1 \wedge 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \wedge 1 & 0 \wedge 0 & 0 \wedge 1 \\ 0 \wedge 0 & 0 \wedge 0 & 0 \wedge 1 \\ 0 \wedge 1 & 0 \wedge 1 & 0 \wedge 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В силу того, что для логического поля имеет место аксиома коммутативности [1], справедливо равенство:

$$\alpha A = A\alpha. \quad (2)$$

Для любой логической матрицы над K и для любых логических скаляров $\alpha, \beta \in K$ имеют место следующие соотношения:

$$1 \cdot A = A; \quad (3)$$

$$0 \cdot A = 0; \quad (4)$$

$$\alpha \cdot 0 = 0; \quad (5)$$

$$\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A. \quad (6)$$

Логической суммой (дизъюнкцией) двух логических матриц над K , имеющих соответственно равное число строк и столбцов, называется матрица, имеющая то же число строк и столбцов, и элементы которой равны логическим суммам (дизъюнкциям) соответствующих элементов складываемых матриц:

$$C = A \vee B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} \vee b_{11} & \dots & a_{1n} \vee b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} \vee b_{m1} & \dots & a_{mn} \vee b_{mn} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Например:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \vee 0 & 1 \vee 1 & 1 \vee 1 \\ 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 1 \\ 0 \vee 1 & 0 \vee 1 & 1 \vee 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Из определения дизъюнкции логических матриц вытекают следующие соотношения: дизъюнкция матриц коммутативна $A \vee B = B \vee A$; дизъюнкция матриц ассоциативна $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$; дизъюнкция матриц дистрибутивна относительно умножения на скаляр $\alpha(A \vee B) = \alpha A \vee \alpha B$; умножение матрицы на скаляр дистрибутивно относительно дизъюнкции скаляров $(\alpha \vee \beta)A = \alpha A \vee \beta A$; закон нуля $A \vee 0 = 0 \vee A = A$; закон идемпотентности $A \vee A = A$.

Докажем первое из перечисленных свойств, т.е. свойство коммутативности. Для этого установим равенство соответствующих элементов для матриц, стоящих в левой и правой частях этого соотношения. Пусть $C = A \vee B = \|c_{ij}\|$. По определению дизъюнкции матриц, $c_{ij} = a_{ij} \vee b_{ij}$. Пусть теперь $D = B \vee A = \|d_{ij}\|$. В силу того же определения, $d_{ij} = b_{ij} \vee a_{ij}$. Так как для логического поля выполняется аксиома коммутативности, то $a_{ij} \vee b_{ij} = b_{ij} \vee a_{ij}$. Следовательно, $c_{ij} = d_{ij}$, т.е. элементы, стоящие на соответственных местах матриц в левой и правой частях соотношения коммутативности, равны. Из этого вытекает равенство самих матриц. Таким образом, свойство коммутативности доказано. Доказательство остальных соотношений проводится аналогичным образом.

Конъюнкцией двух матриц над K , имеющих соответственно равное число столбцов и строк, называется такая логическая матрица над K , которая имеет такое же число строк и столбцов, и элементы которой равны конъюнкциям соответствующих элементов перемножаемых матриц:

$$C = A \wedge B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \wedge b_{11} & \dots & a_{1n} \wedge b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} \wedge b_{m1} & \dots & a_{mn} \wedge b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Например:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \wedge 0 & 1 \wedge 1 & 1 \wedge 1 \\ 1 \wedge 0 & 1 \wedge 1 & 0 \wedge 1 \\ 1 \wedge 1 & 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для конъюнкции матриц выполняются следующие соотношения: коммутативности $A \wedge B = B \wedge A$; ассоциативности $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$; ассоциативности относительно умножения на скаляр $\alpha(A \wedge B) = (\alpha A) \wedge B$; дистрибутивности $(A \vee B) \wedge C = A \wedge C \vee B \wedge C$, $A \wedge B \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C)$; элиминации $A \vee A \wedge B = A$; $A \wedge (A \vee B) = A$; идемпотентности $A \wedge A = A$; закон нуля $A \wedge 0 = 0$. Доказательство этих соотношений проводится аналогично доказательству коммутативности дизъюнкции матриц.

Отрицанием матрицы $\bar{A}$ называется матрица, элементы которой равны $\bar{a}_{ij}$. Для отрицания матриц выполняются следующие равенства:

закон противоречия $A \wedge \bar{A} = 0$; закон двойного отрицания $\bar{\bar{A}} = A$; закон исключения третьего $A \vee \bar{A} = 1$; законы свертывания $A \vee B \wedge \bar{B} = A$, $A \wedge (B \vee \bar{B}) = A$; законы де Моргана $\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$, $\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$. Доказательство этих утверждений также проводится аналогично приведенному выше.

В отличие от перечисленных выше операций с матрицами, операция логического умножения одной логической матрицы на другую определяется несколько сложнее. Пусть есть две логические матрицы A и B , причем число столбцов первой из них совпадает с числом строк второй. Только при соблюдении этого условия операция умножения одной логической матрицы на другую имеет смысл. В противном случае ее выполнить невозможно. *Правило умножения матриц:* чтобы получить элемент, стоящий в i -й строке и j -м столбце матрицы, полученной в результате умножения, нужно элементы i -й строки первой матрицы умножить на соответственные элементы j -го столбца второй и полученные результаты сложить. Т.е. если матрица $A = \|a_{ij}\|_{m \times n}$, а $B = \|b_{ij}\|_{n \times k}$, то элементы матрицы $C = AB$ будут определяться по формуле

$$c_{ip} = a_{i1}b_{1p} \vee a_{i2}b_{2p} \vee \dots \vee a_{in}b_{np} \quad (i=1 \dots m, p=1 \dots k, j=1 \dots n). \quad (8)$$

Например:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 \\ 1 \wedge 1 \vee 1 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 \\ 0 \wedge 1 \vee 1 \wedge 1 & 0 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 & 0 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Умножение двух матриц, вообще говоря, некоммукативно. Оно зависит от порядка сомножителей. Если в приведенном примере мы поменяем порядок умножаемых матриц, то результат будет другим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 & 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 \vee 0 \wedge 1 \\ 1 \wedge 1 \vee 1 \wedge 1 \vee 1 \wedge 0 & 1 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 \vee 1 \wedge 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Если рассматривать матрицы не квадратные, то может получиться так, что в одном порядке операция их умножения имеет смысл, а в обратном — нет. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим две логические матрицы $A = \|a_{ij}\|_{2 \times 3}$ и $B = \|b_{jp}\|_{3 \times 4}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Если же мы поменяем порядок сомножителей, то выполняемая операция не будет иметь смысла, так как число столбцов матрицы B не равно числу строк матрицы A .

Рассмотрим теперь основные свойства умножения матриц:

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B; \quad (9)$$

$$A(\alpha B) = (A\alpha)B; \quad (10)$$

$$(AB)\alpha = A(B\alpha). \quad (11)$$

Докажем свойство (9). Пусть $A = \|a_{ij}\|_{m \times n}$, $B = \|b_{jp}\|_{n \times p}$. Пользуясь правилом умножения матриц, получаем для элемента, стоящего в i -й строке и k -м столбце матрицы $\alpha(AB)$ ($i=1 \dots m$, $k=1 \dots p$) следующее выражение: $c_{ik} = \alpha(a_{i1}b_{1k} \vee \dots \vee a_{in}b_{nk})$. Аналогично для элемента, стоящего в той же i -й строке и k -м столбце матрицы $(\alpha A)B$, получаем выражение: $d_{ik} = (\alpha a_{i1})b_{1k} \vee \dots \vee (\alpha a_{in})b_{nk}$. Выражения для c_{ik} и d_{ik} равны. Следовательно, равны и сами элементы, из чего вытекает равенство матриц, стоящих в левой и правой частях равенства (9). Аналогичным образом доказываются свойства (10)—(11), а также свойства (12)—(13):

$$(A \vee B)C = AC \vee BC; \quad (12)$$

$$C(A \vee B) = CA \vee CB. \quad (13)$$

Из свойств (12)—(13) непосредственно вытекает следующее правило: чтобы умножить дизъюнкцию логических матриц на дизъюнкцию, необходимо каждую матрицу первой дизъюнкции умножить на каждую матрицу второй и полученные результаты сложить. Для умножения логических матриц выполняется свойство *ассоциативности*:

$$A(BC) = (AB)C \quad (14)$$

В силу того, что операции дизъюнкции, конъюнкции и умножения можно применять не к любым матрицам, а только к тем, количество строк и столбцов которых удовлетворяет указанным выше условиям, соотношения (12)—(14) следует понимать таким образом, что если действия, указанные по одну сторону от знака равенства, возможны, то также имеют смысл и действия, указанные по другую его сторону, а результаты в обоих случаях совпадают. Докажем равенство (14). Для этого положим $AB=M$, а $BC=N$ и обозначим элементы матриц M и N через μ_{ik} и η_{jl} . Согласно правилу умножения матриц имеем:

$$\mu_{ik} = a_{i1}b_{1k} \vee \dots \vee a_{in}b_{nk}, \quad \eta_{jl} = b_{j1}c_{1l} \vee \dots \vee b_{jp}c_{pl},$$

где a_{ij} , b_{jk} , c_{kl} — элементы матриц A , B , C . Выполняя операцию логического умножения матрицы M на C , в i -й строке и в l -м столбце матрицы $(AB)C$, получим

$$\mu_{i1}c_{1l} \vee \dots \vee \mu_{ip}c_{pl} = \vee_j \vee_k a_{ij}b_{jk}c_{kl}.$$

Аналогично, выполняя умножение A на N , в i -й строке и l -м столбце матрицы $A(BC)$, получим дизъюнкцию:

$$a_{i1}\eta_{1l} \vee \dots \vee a_{ip}\eta_{pl} = \vee_j \vee_k a_{ij}b_{jk}c_{kl}.$$

Так как обе эти дизъюнкции отличаются только порядком слагаемых, то равенство (14) доказано. Из соотношения (14) следует, что результат умножения нескольких матриц A , B , C , ..., Z , записанных в определенном порядке, от способа расстановки скобок не зависит. Поэтому можно говорить не только об умножении двух, но и об умножении большего числа матриц. Например, можно говорить просто об умножении четырех матриц $ABCD$, так как все пять возможных способов вычисления результата этой операции $((AB)C)D$, $(A(BC))D$, $A((BC)D)$, $A(B(CD))$, $(AB)(CD)$ дают один и тот же

результат в силу того, что каждый следующий результат умножения получается из предшествующего непосредственным применением закона ассоциативности (14).

Рассмотрим произвольную логическую матрицу $A = \|a_{ij}\|_{mn}$. Оказывается, что

$$AE = EA = A. \quad (15)$$

Чтобы имели смысл все выражения из равенства (15), единичная матрица E в первом произведении должна иметь порядок n , а во втором — порядок m . Обозначим AE через B , а EA — через C . Элементы матриц B и C обозначим соответственно через b_{ij} и c_{ij} . Пользуясь правилом умножения матриц, запишем выражения для b_{ij} и c_{ij} :

$$b_{ij} = a_{i1} \cdot 0 \vee \dots \vee a_{ij} \cdot 1 \vee \dots \vee a_{in} \cdot 0 = a_{ij},$$

$$c_{ij} = 0 \cdot a_{i1} \vee \dots \vee 1 \cdot a_{ij} \vee \dots \vee 0 \cdot a_{in} = a_{ij}.$$

Очевидно, что $a_{ij} = b_{ij} = c_{ij}$. Следовательно, равны и соответствующие матрицы, что и доказывает утверждение (15).

Рассмотрим произвольную логическую матрицу A . Если в ней произвести замену строк столбцами, то полученная матрица будет называться *транспонированной* по отношению к A и обозначаться символом A^T :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

Например:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для произвольных логических матриц A и B и логических скаляров α и β имеют место следующие правила транспонирования:

$$(\alpha A \vee \beta B)^T = \alpha A^T \vee \beta B^T, \quad (16)$$

$$\overline{A^T} = \overline{A}^T, \quad (17)$$

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad (18)$$

$$(\alpha A \wedge \beta B)^T = \alpha A^T \wedge \beta B^T. \quad (19)$$

Докажем равенство (18). Элемент, стоящий в i -й строке и j -м столбце матрицы $C = (AB)^T$, равен элементу, стоящему в j -й строке и i -м столбце матрицы AB , т.е. он равен $c_{ij} = a_{j1}b_{1i} \vee \dots \vee a_{jn}b_{ni}$, где a_{jp} , b_{pi} — элементы матриц A и B соответственно. Но это выражение есть дизъюнкция результатов логического умножения элементов i -й строки матрицы B^T на соответственные элементы j -го столбца матрицы A^T , так что $(AB)^T = B^T A^T$, что и доказывает равенство (18). Пусть A — произвольная квадратная матрица над K . Тогда если выполняется соотношение $A^T = A$, то такая матрица называется *симметрической*. Например, логическая матрица

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

является симметрической. Из правил транспонирования дизъюнкции, конъюнкции и отрицания матриц непосредственно вытекает, что дизъюнкция, конъюнкция и отрицание симметрических матриц есть матрицы симметрические. Например, пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$A \vee B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A \wedge B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результат умножения симметрических матриц может и не быть симметрической матрицей. Это видно из приведенного ниже примера:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Произвольная квадратная логическая матрица над K называется *обратимой*, если существует квадратная матрица B над K , удовлетворяющая следующему соотношению:

$$AB=BA=E. \quad (20)$$

Если некоторая матрица B удовлетворяет этому соотношению, то она называется *матрицей, обратной к A* , или *обращением матрицы A* . Если матрица A обратима, то существует лишь одно ее обращение. Действительно, если кроме матрицы B условиям (20) удовлетворяет и матрица C , то умножив обе части равенства $AC=E$ слева на B , мы получим $BAC=BE$, или $C=B$. Если обращение матрицы A существует, оно обозначается символом A^{-1} . Таким образом,

$$AA^{-1}=A^{-1}A=E. \quad (21)$$

В условие (20) матрицы A и B входят симметрично. В силу этого, если для A обращением является матрица B , то для B обращением является матрица A . Другими словами,

$$(A^{-1})^{-1}=A. \quad (22)$$

Если для квадратных матриц D, F, G одного порядка существует обращение, то результат их логического умножения также обратим, причем

$$(DFG)^{-1}=G^{-1}F^{-1}D^{-1}, \quad (23)$$

т.е. обращение результата умножения матриц равно результату умножения обращений сомножителей, расположенных в противоположном порядке. Чтобы доказать это утверждение, достаточно проверить равенство $D^{-1}F^{-1}G^{-1}GFD=GFDD^{-1}F^{-1}G^{-1}$, являющееся очевидными следствиями соотношения вида (21) для матриц D, F, G . Для каждой матрицы A , у которой существует обращение, кроме ее нулевой и натуральных степеней $A^0=E$, $A^1=A$, $A^2=AA$ и т.д., рассмотрим также ее целые отрицательные степени:

$$A^{-2}=A^{-1}A^{-1}; A^{-3}=A^{-1}A^{-1}A^{-1}. \quad (24)$$

Дробные степени для матриц не вводим. Из соотношений (21) и (24) следует, что к любой обратимой матрице A и к любым целым (не обязательно

положительным) числам p, q можно применять обычные правила действия со степенями:

$$A^p A^q = A^{p+q}; \quad (25)$$

$$(A^p)^q = A^{pq}. \quad (26)$$

Логические матрицы над K , для которых выполняется условие $AB=BA$, называются *перестановочными*. Если матрицы A и B обратимы и перестановочны, то

$$(AB)^p = A^p B^p \quad (27)$$

Рассмотрим связь операций транспонирования и обращения. Применяя правило транспонирования результата умножения матриц (18) к соотношениям (21), получаем:

$$(A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = E, \quad (28)$$

т.е. в результате транспонирования обратимой матрицы A получаем снова обратимую матрицу

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T. \quad (29)$$

Квадратная матрица A называется *ортогональной*, если каждый ее столбец и каждая ее строка содержат ровно по одной единице. Для ортогональных матриц выполняется соотношение

$$AA^T = A^T A = E, \quad (30)$$

т.е. транспонированная матрица обратна к исходной. Отсюда, в частности, следует, что каждая ортогональная матрица обратима. Обращение ортогональной матрицы является ортогональной матрицей. Далее, если матрицы A и B ортогональны, то $A^T = A^{-1}$, $B^T = B^{-1}$, а значит, $(AB)^T = B^T A^T = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$. Другими словами, результат умножения ортогональных матриц является ортогональной матрицей.

Теорема 1. Пусть A и B — квадратные логические матрицы над K и $AB=E$. Тогда A и B — ортогональные матрицы и $B=A^T$.

Доказательство. Пусть размерность матриц A и B — $n \times n$. Выберем произвольно целое k , $1 \leq k \leq n$. Если k -я строка матрицы A нулевая, то и k -я строка матрицы AB будет нулевой. Поэтому в каждой строке матрицы A есть хотя бы одна единица и этой единице соответствует некоторая единица в матрице B (пусть это будет элемент $a_{kj}=1$, которому соответствует b_{jk}). При $s \neq k$ ($1 \leq s \leq n$) имеем $a_{sj}=0$, так как иначе $(AB)_{sk} = a_{sj}b_{jk} = 1$, т.е. $AB \neq E$. Аналогично, в матрице B все элементы строки j , за исключением b_{jk} равны

нулю. Таким образом, в каждой строке матрицы A есть хотя бы одна единица, причем все эти единицы расположены в разных столбцах. Поэтому матрица A — ортогональна. Аналогично, ортогональна и матрица B . Равенство $B=A^T$ теперь очевидно (каждому элементу $a_{ij}=1$ соответствует $b_{jk}=1$). Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что логическая матрица A обратима в том и только в том случае, когда в каждой ее строке и в каждом ее столбце только один элемент будет равным единице, а все остальные — нулю, и обращение A будет являться ее транспонированной матрицей. Проиллюстрируем это утверждение на примере. Имеем

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Отметим, что обратимые логические матрицы размерности $n \times n$ образуют группу, изоморфную группе перестановок из n элементов. Теперь возьмем логическую матрицу A , у которой есть столбцы и строки, содержащие больше одной единицы. Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Теорема 2. *Результат умножения произвольной логической матрицы на ее транспонированную матрицу является матрицей симметрической.*

Доказательство. Пусть имеется логическая матрица A и ее транспонированная матрица A^T . Тогда $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$, так как $(A^T)^T = A$. Теорема доказана.

Список литературы: 1. Гвоздинская Н.А., Дударь З.В., Пославский С.А., Шабанов-Кушнаренко Ю.П. О логических пространствах // АСУ и приборы автоматики. Вып.106, 1997. С. 21—30.
2. Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Логическая алгебра // Проблемы бионики. 1991. Вып.46. С. 3—10. 3. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры М.:Наука, 1975. 400 с.

Поступила в редколлегию 15.10.97